

Машинное обучение.

Домашнее задание №11

Задача 1. Пусть $X, A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ — невырожденные матрицы. Покажите, что

$$\nabla_X \det AXB = X^{-T} \det AXB.$$

Задача 2. В нормальном дискриминантном анализе возникает задача максимизации правдоподобия

$$\log p(X_y | \mu_y, \Sigma_y) = \sum_{i=1}^m \log \mathcal{N}(x_i | \mu_y, \Sigma_y) \rightarrow \max_{\mu_y, \Sigma_y}.$$

Рассмотрим задачу максимизации *взвешенного* правдоподобия:

$$\log p(X_y | \mu_y, \Sigma_y) = \sum_{i=1}^m w_i \log \mathcal{N}(x_i | \mu_y, \Sigma_y) \rightarrow \max_{\mu_y, \Sigma_y},$$

где $w_i \geq 0$. Найдите ее решение.

Задача 3. Рассмотрим задачу классификации с двумя классами $Y = \{1, 2\}$ и нормальный байесовский классификатор

$$a(x) = \arg \max_{y \in \{1, 2\}} p(y)p(x | y),$$

в котором плотности классов $p(x | y)$ — это многомерные нормальные распределения $\mathcal{N}(\mu_y, \Sigma_y)$. Пусть векторы матожиданий имеют вид $\mu_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ и $\mu_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, ковариационные матрицы совпадают и равны $\Sigma = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. Априорные вероятности классов равны $p(1) = 1/3$ и $p(2) = 2/3$.

1. Выпишите уравнение разделяющей поверхности классификатора $a(x)$.
2. Найдите собственное разложение матрицы Σ .
3. Перейдите к новым координатам, оси которых совпадают с собственными векторами матрицы Σ .
4. Выпишите уравнение разделяющей поверхности классификатора $a(x)$ в новых координатах.