

Домашняя работа 1: Скорости сходимости и матрично-векторное дифференцирование

Срок сдачи: 20 сентября 2017 (среда), 23:59 для ВМК
29 сентября 2017 (пятница), 23:59 для Физтеха

1 Пусть $(r_k)_{k=1}^\infty$ — одна из следующих последовательностей:

- | | | |
|---------------------------|-------------------------|---|
| (a) $r_k := (0.99)^k$ | (e) $r_k := 1/\sqrt{k}$ | (i) $r_k := \begin{cases} (0.99)^{2^k}, & \text{если } k \text{ четное,} \\ r_{k-1}/k, & \text{иначе} \end{cases}$ |
| (b) $r_k := (0.99)^{k^2}$ | (f) $r_k := 1/k^2$ | |
| (c) $r_k := (0.99)^{2^k}$ | (g) $r_k := 1/k!$ | (j) $(r_k)_{k=1}^\infty := (1, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{1}{8}, \frac{1}{4}, \frac{1}{16}, \frac{1}{8}, \dots)$ |
| (d) $r_k := 1/k$ | (h) $r_k := 1/k^k$ | |

Для каждого из указанных вариантов классифицируйте $(r_k)_{k=1}^\infty$ по скорости сходимости (линейная, сублинейная, сверхлинейная). В случае сверхлинейной сходимости дополнительно выясните, имеет ли место квадратичная сходимость.

(Рекомендация. Некоторые последовательности удобно ограничить сверху/снизу другими более простыми, для которых уже известна скорость сходимости.)

2 Пусть $C > 0$, и пусть $(r_k)_{k=1}^\infty$ — одна из следующих трех последовательностей:

- (a) (Сублинейная) $r_k := C/k^\gamma$, где $\gamma > 0$.
 (b) (Линейная) $r_k := Cq^k$, где $0 < q < 1$.
 (c) (Квадратичная) $r_k := C(C^{-1}R)^{2^k}$, где $R > 0$ и $0 < C^{-1}R < 1$.

Пусть $0 < \varepsilon < 1$, и пусть $T(\varepsilon) := \min\{k \geq 1 : r_k \leq \varepsilon C\}$ — первый момент времени достижения относительной точности ε .

- (a) Для каждого из трех вариантов последовательности выпишите явную формулу для T .
 (b) Проанализируйте, насколько сильно T зависит от точности ε и параметра последовательности (γ , q , R соответственно).
 (c) Заполните следующие таблицы, вписав в пустые ячейки соответствующие числовые значения T :

Сублинейная				Линейная				Квадратичная			
	γ	1	2	q	0.9	0.999	0.99999	R	$0.9C$	$0.999C$	$0.99999C$
ε				ε				ε			
10^{-1}				10^{-1}				10^{-1}			
10^{-3}				10^{-3}				10^{-3}			
10^{-5}				10^{-5}				10^{-5}			
10^{-7}				10^{-7}				10^{-7}			
10^{-12}				10^{-12}				10^{-12}			

(Рекомендация. Напишите программу, которая заполнит эти таблицы автоматически. Достаточно выписать одну значимую цифру и степень (например: 3×10^8).)

3 Упростите каждое из следующих выражений:

- (a) $\text{Det}(AXB(C^{-T}X^TC)^{-T})$, где $A, B, C, X \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $\text{Det}(C) \neq 0$, $\text{Det}(C^{-T}X^TC) \neq 0$.
 (b) $\|uv^T - A\|_F^2 - \|A\|_F^2$, где $u \in \mathbb{R}^m$, $v \in \mathbb{R}^n$, $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$.
 (c) $\text{Tr}((2I_n + aa^T)^{-1}(uv^T + vu^T))$, где $a, u, v \in \mathbb{R}^n$.

(d) $\sum_{i=1}^n \langle S^{-1}a_i, a_i \rangle$, где $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}^n$, $S := \sum_{i=1}^n a_i a_i^T$, $\text{Det}(S) \neq 0$.

4 Пусть f — одна из следующих функций:

(a) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ — функция $f(t) := \text{Det}(A - tI_n)$.

(b) $f : \mathbb{R}_{++} \rightarrow \mathbb{R}$ — функция $f(t) := |(A + tI_n)^{-1}b|^2$, где $A \in \mathbb{S}_+^n$, $b \in \mathbb{R}^n$.

Для каждого из указанных вариантов вычислите первую и вторую производные f' и f'' .

5 Пусть f — одна из следующих функций:

(a) $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ — функция $f(x) := \frac{1}{2} \|xx^T - A\|_F^2$, где $A \in \mathbb{S}^n$.

(b) $f : \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ — функция $f(x) := \frac{\langle Ax, x \rangle}{|x|^2}$, где $A \in \mathbb{S}^n$.

(c) $f : \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ — функция $f(x) := \langle x, x \rangle^{\langle x, x \rangle}$.

Для каждого из указанных вариантов вычислите вектор градиент ∇f и матрицу гессиан $\nabla^2 f$ (относительно стандартного скалярного произведения в пространстве \mathbb{R}^n).

6 Пусть $f : \mathbb{S}_{++}^n \rightarrow \mathbb{R}$ — одна из следующих функций:

(a) $f(X) := \text{Tr}(X^{-1})$.

(b) $f(X) := \langle X^{-1}v, v \rangle$, где $v \in \mathbb{R}^n$.

(c) $f(X) := (\text{Det}(X))^{1/n}$.

Для каждого из указанных вариантов покажите, что вторая производная $D^2 f(X)[H, H]$ имеет постоянный знак для всех $X \in \mathbb{S}_{++}^n$ и всех $H \in \mathbb{S}^n$.

(Подсказка. В последнем пункте воспользуйтесь неравенством Коши–Буняковского.)

7 Пусть f — одна из следующих функций:

(a) $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ — функция $f(x) := 2x_1^2 + x_2^2(x_2 - 2)$.

(b) $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ — функция $f(x) := (1 - x_1)^2 + 100(x_2 - x_1^2)^2$.

(c) $f : \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ — функция $f(x) := \frac{\langle Ax, x \rangle}{|x|^2}$, где $A \in \mathbb{S}^n$.

Для каждого из указанных вариантов найдите все точки стационарности f и определите их тип (локальный минимум/максимум, седловая точка).

8 Пусть c — ненулевой вектор в \mathbb{R}^n , $\sigma > 0$, и пусть $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ — функция

$$f(x) := \langle c, x \rangle + \frac{\sigma}{3} |x|^3.$$

Найдите единственную точку стационарности функции f .